

SABÍA
QUE

Sobre su medicación

Melfalán es un fármaco antineoplásico que interfiere en la división celular en tejidos de proliferación rápida. Se usa en tratamientos combinados con otros fármacos en mieloma múltiple y carcinoma de ovario.

Posología y forma de administración

Melfalán se administra por vía oral. La dosis recomendada es según prescripción médica.

Habitualmente: 8-10 mg (4-5 COMPRIMIDOS) durante 4 días seguidos.

- Debe tomarlo **sin alimentos**, es decir, 1 hora antes o dos horas después de comer.
- Evite el contacto con la piel. Lávese las manos antes y después de cada toma.
- Los comprimidos deben tragarse enteros con un vaso de agua, sin masticar, ni chupar en la boca, ni disolverlos.
- Mantenga siempre el mismo horario y beba bastante agua durante el tratamiento.
- Los comprimidos debe guardarlos en la nevera, aunque excepcionalmente podrían estar 7 días fuera de ella sin sobrepasar los 30°C

Qué hacer si...

Si se ha olvidado de tomar una dosis tómela lo antes posible. Si han transcurrido más de 12 horas espere a la siguiente toma y **no doble nunca la dosis**.

Si vomita, únicamente repita la dosis si ha transcurrido menos de 1 hora desde la toma.

En caso de duda coméntelo con su médico o farmacéutico.

Precauciones

- Si tiene enfermedad hepática o renal grave.
- Si tiene afectada la absorción intestinal o si se ha sometido a una resección quirúrgica de intestino o estómago.
- **Adopte 2 medidas anticonceptivas** si usted o su pareja puede quedarse embarazada y manténgalas hasta 6 meses después de haber finalizado el tratamiento.
- Consulte con su médico o farmacéutico antes de vacunarse.
- Este medicamento contiene lactosa.

No tome Melfalán si.....

Si usted es alérgico a melfalán, así como a cualquiera de los componentes del comprimido.

Si está embarazada o en período de lactancia.

Efectos adversos

Los efectos adversos más frecuentes, que no significa que aparezcan en todos los pacientes, son:

- Dolores musculares y en articulaciones, inflamación de piernas y pies.
- Caída leve del cabello.
- Náuseas, vómitos, llagas en la boca. Mantenga una adecuada higiene bucal.
- Mayor susceptibilidad a tener infecciones. Debe tomar medidas higiénicas.
- Picor y erupciones en la piel.
- Podría aumentar el riesgo de hemorragias.

AVISE A SU MÉDICO RÁPIDAMENTE SI TIENE:

Una reacción alérgica grave: (enrojecimiento de la piel, dificultad al respirar, etc.).

Signos de infección como fiebre > 38°C, escalofríos, tos, dificultad al orinar.

Signos de sangrado: heces negras, sangre en la orina o hematomas importantes.

Convulsiones

En caso de sobredosis.

Interacciones

Melfalán puede interactuar con algunos medicamentos, entre ellos:

Aspirina, fármacos que afecten a la coagulación, inmunosupresores como la ciclosporina, digoxina, determinados antibióticos e incluso productos naturales como algunos probióticos

CONSULTE A SU FARMACÉUTICO O MÉDICO ANTES DE TOMAR UN NUEVO MEDICAMENTO, COMPLEMENTO ALIMENTICIO O PLANTA MEDICINAL