

SABÍA QUE

Venetoclax es un **antineoplásico** (inhibidor de BCL-2) que impide el crecimiento de las células tumorales, utilizado en el tratamiento de la leucemia linfocítica crónica (LLC) y la leucemia mieloide aguda (LMA). Venetoclax actúa bloqueando una proteína del organismo llamada “**BCL-2**”. Esta proteína ayuda a las células cancerosas a sobrevivir. El bloqueo de esta proteína facilita la destrucción de las células cancerosas y la reducción de su número. También retrasa el empeoramiento de la enfermedad.

Para qué se utiliza

Para el tratamiento de la LMA, venetoclax se administra en combinación con otros medicamentos. Para la LLC, venetoclax se puede tomar como tratamiento único o en combinación con obinutuzumab o ibrutinib.

Posología y forma de administración

➤ Venetoclax se administra vía oral **con alimentos** una vez al día (procurar que sea siempre a la misma hora). Los comprimidos deben tragarse enteros con un vaso de agua, sin masticar ni chupar en la boca. Si tiene problemas para tragarlo puede contactar con nosotros y le daremos instrucciones.

➤ Evite el contacto con la piel: lávese las manos antes y después de manipularlos.

➤ La dosis varía de un paciente a otro, por lo que **siga las recomendaciones médicas**:

- Empezará el tratamiento con venetoclax a una dosis baja durante una semana y el médico le aumentará gradualmente la dosis durante las próximas 4 semanas hasta la dosis estándar completa.

- Tras la subida de dosis deberá tomar CUATRO comprimidos de VENETOCLAX juntos a la misma hora cada día.

- La dosis también puede variar en caso de interacción con otro fármaco (ver **Interacciones**).

- **Recuerde que es fundamental para alcanzar una buena respuesta molecular la adecuada adherencia al tratamiento**, es decir, intentar que no se olvide ninguna o casi ninguna dosis y **no interrumpir nunca el tratamiento** sin que se lo diga su médico. Evite el zumo de pomelo y las naranjas amargas, hierba de San Juan y la carambola (fruta estrella).

Qué hacer si...

- Si se ha olvidado tomar una dosis: tómela si quedan más de 16 horas para la próxima dosis y después, retome su horario habitual. No doble nunca una dosis para compensar una olvidada.
- Si vomita, no tome otra dosis ese día, y continúe su tratamiento con normalidad.

Eventos adversos

Hay que decir que no todas las personas los padecen y que generalmente aparecen al principio y desaparecen conforme avanza el tratamiento. En cualquier caso ante la aparición de algún síntoma no dude en consultar. Los **más frecuentes** son:

- Dolor de cabeza, **cansancio**
- **Náuseas, vómitos y diarrea**
- Estreñimiento
- Sangrado, **hematomas**
- Reacciones dérmicas
- Dolor óseo/muscular
- Aumento de infecciones, **anemia, disminución de defensas y plaquetas**
- Aumento del ác. úrico y creatinina en sangre
- Alteración del fósforo, potasio, calcio en sangre

AVISE A SU MÉDICO RÁPIDAMENTE SI TIENE: una reacción alérgica grave; signos de infección como tos, escalofríos, dificultad al orinar o fiebre; signos de sangrado (heces negras, sangre en la orina, hematomas importantes); convulsiones; confusión; alucinaciones o signos cardíacos (palpitaciones, dolor en el pecho, dificultad al respirar).

Contraindicaciones

- Si usted es alérgico a venetoclax o a cualquiera de los excipientes.
- Si está embarazada o en período de lactancia.

Precauciones

- Si padece una enfermedad renal/hepática.
- Advierta a su médico si va a someterse a una **intervención quirúrgica programada**.
- Las mujeres en edad fértil deben utilizar un **método anticonceptivo** altamente eficaz durante el tratamiento y al menos 30 días después de haber recibido venetoclax. Si está utilizando píldoras o dispositivos anticonceptivos hormonales, tiene que utilizar también un método anticonceptivo de barrera (preservativo).
- Se recomienda una **adecuada hidratación** (incluye beber suficiente agua), usar gel de baño sin detergente y champús suaves y, si se reseca la piel, cremas hidratantes.
- Consulte con su médico o farmacéutico antes de vacunarse.

Interacciones

Pregunte a su farmacéutico o médico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal, especialmente si toma: antifúngicos (POSACONAZOL), antibióticos, fármacos para el corazón y el colesterol (simvastatina, atorvastatina), everolimus, sirolimus, digoxina, antiepilépticos (carbamazepina), anticoagulantes (acenocumarol, dabigatran), colestiramina o colestipol.

Más información en <https://www.sefh.es/escuela-de-pacientes-enfermedad-detalle.php?id=6>