

SABÍA  
QUE...

**HIPERTENSIÓN PULMONAR (HAP)** es una presión arterial alta en las arterias de los pulmones por engrosamiento de las paredes del lecho vascular. Hace que el lado derecho del corazón se tenga que esforzar más de lo normal. Las causas pueden ser variadas, e incluso no tener una causa clara. Los primeros síntomas suelen ser dificultad para respirar, fatiga e incluso mareos leves; y es frecuente que presente también palpitaciones. A partir de ahí pueden darse muchos síntomas según la evolución de la enfermedad.

El **objetivo** del tratamiento es controlar los síntomas y evitar que la enfermedad progrese. Para ello es importante seguir bien el tratamiento y los consejos en cuanto a dieta y ejercicio

**Sotatercept** (Winrevair®) es un inhibidor de la señalización de activina, proteína cuyos niveles están aumentados en HAP. Está indicado, combinado con otros fármacos, en el tratamiento de HAP de grupo funcional II o III. Finalmente actúa ensanchando las arterias pulmonares, facilitando la labor del corazón en bombear sangre a través de ellas. Esto reduce la tensión arterial y alivia los síntomas.

### Datos de administración

Se presenta en viales con polvo para reconstituir de 45 y 60 mg. El envase contiene también una jeringa precargada con el disolvente con la que debe reconstituir (disolver) el polvo del vial según instrucciones del prospecto.

- La dosis varía según el peso del paciente, y se inicia con una más baja, 0,3 mg/kg, para ver tolerancia. Avise si cambia de peso significativamente.
- Según el resultado de la analítica le pondrán la dosis plena (0,7 mg/kg) en las sucesivas dosis. Es muy importante que acuda a las citas de extracciones.
- Las dosis sucesivas serán cada 21 días

Una vez reconstituido se debe administrar lo antes posible (en 4 horas máximo)

### ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si olvida una dosis debe administrársela lo antes posible:

- Si no han pasado más de tres días siga su calendario habitual,
- Si ha pasado más tiempo debe ajustar un nuevo calendario a partir de esa administración.

**No tome una dosis doble para compensar el olvido.**

### No se administre Winrevair si

- Es alérgico a sotatercept o a alguno de sus excipientes
- Si tiene un número de plaquetas muy bajas al inicio del tratamiento
- En embarazo y lactancia. Si está en edad fértil debe usar métodos anticonceptivos



- La vía de administración es **subcutánea**.
- Las mejores zonas para la inyección son aquellas donde la piel es blanda y suave, y lejos de articulaciones, nervios o huesos. Por ejemplo, abdomen (evitando el área de 5 cm que rodea el ombligo), brazo, muslo o nalgas .
- Desinfecte la zona de la piel donde vaya a inyectarse.
- Alterne el punto de inyección y anótelos.
- No utilice regiones de la piel con hematomas, doloridas, infectadas o si presentan una herida abierta.

Es importante preparar la medicación en un espacio limpio y llevar a cabo los preparativos con **tranquilidad**, sin prisas. Y recuerde también que antes de la administración debe dejar la jeringa fuera de la nevera alrededor de media hora. NO utilice NINGUNA FUENTE DE CALOR para ello.



**JERINGA:** Introduzca la aguja en su totalidad formando un ángulo de 45° e inyecte de forma lenta y constante.

### Precauciones

Consulte a su médico antes de empezar a tomar este medicamento si tiene:

- Hipotensión en reposo.
- Insuficiencia hepática o renal.
- Posibilidad de embarazo
- Hipertiroidismo.

### Efectos adversos

Los efectos adversos más frecuentes, que no quiere decir que ocurra en todos los pacientes, son:

- Dolor de cabeza o mareos
- Epistaxis (sangrado por la nariz)
- Diarrea
- Erupción cutánea o teleangiectasia (aparición de venitas marcadas en la piel)

Avise a su médico en caso de aparición de reacción alérgica (dificultad de respirar, hinchazón de cara, erupción generalizada,...) También si presenta hemorragias, y ante cualquier reacción adversa grave que note tras iniciar el tratamiento. Es muy **IMPORTANTE** que se haga todos los controles que le indiquen

### Toma de SOTATERCEPT con otros medicamentos

En principio, y debido a su mecanismo de eliminación del organismo, no hay evidencia de interacciones con otros medicamentos.

No obstante, precaución si se administra junto a medicamentos hepatotóxicos o que puedan causar hemorragias

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.